



Actualizada 2/06

La tos ferina (pertusis) es una infección bacteriana altamente contagiosa, la cual causa tos y atragantamiento con fiebre leve o sin fiebre. Una persona que ha contraído la enfermedad demuestra episodios de tos que pueden causar el vómito o un sonido de jadeo cuando la persona trata de inhalar.

-
- ³ Los síntomas aparecen entre 6 a 21 días (un promedio de 7-10) después de haber sido expuesto a una persona contagiada de tos ferina.
 - ³ La enfermedad comienza con síntomas de gripe: mucosidad nasal, dolor de garganta y tos. Algunas veces ocurren episodios de tos severa durante las primeras 2 semanas, los cuales pueden durar hasta 10 semanas. La persona infectada puede verse y sentirse un poco bien entre estos episodios de tos.
 - ³ Durante los episodios de tos, los labios y uñas pueden ponerse azules debido a la falta de aire. Puede ocurrir el vómito después de episodios severos de tos.
 - ³ La tos puede empeorar durante la noche cuando la persona está acostada sobre su espalda, causando la pérdida del sueño.
 - ³ Los niños y adultos que han sido vacunados suelen tener síntomas más leves en comparación a niños más pequeños.

-
- ³ La tos ferina es más peligrosa para los niños menores de 1 año de edad. Las complicaciones en infantes incluyen: neumonía, convulsiones, y en raras ocasiones, daño cerebral o muerte.
 - ³ Las complicaciones serias son menos posibles en niños más grandes y adultos

-
- ³ La tos ferina es transmitida a través del contacto directo o indirecto con gotitas esparcidas en el aire cuando una persona infectada tose, estornuda o habla.
 - ³ Le enfermedad puede ser transmitida en la primera etapa cuando los síntomas son parecidos a una gripe común o más tarde cuando la persona infectada comienza a toser.
 - ³ Las personas que reciben tratamie
-